RESORCINA, SALICÍLICO, CORTICÓIDE

INFORMACIÓN AL PACIENTE

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión.

DOSIS UNITARIA: Cada gramo del preparado contiene miligramos de resorcina, miligramos de ácido salicílico, miligramos de clobetasol.

NÚMERO DE DOSIS:

INDICACIONES: Queratolítico. Tratamiento de psoriasis, dermatitis seborréica, pitiriasis e hiperqueratosis del cuero cabelludo, y otras afecciones para las que su médico lo estime conveniente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

POSOLOGÍA: **Según indicación médica.**

Posología USUAL y NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Siga estrictamente las dosis y pautas (modo de empleo y duración del tratamiento) indicadas por su médico. Salvo distinto criterio médico aplicar por la noche sobre la zona afectada del cuero cabelludo y lavar a la mañana siguiente con un champú neutro tipo bebé. Si es para otra zona corporal distinta al cuero cabelludo, aplicar el preparado (salvo distinto criterio médico) 1-2 veces al día sobre la zona afectada, lavando y secando bien dicha zona antes de la aplicación. Lavar las manos antes y después de cada aplicación. No aplicar vendaje oclusivo en zonas muy extensas de la piel, ya que puede producirse absorción sistémica con riesgo de toxicidad. No emplear en zonas próximas a los ojos.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Evitar contacto con mucosas, si esto ocurriera lavar con abundante agua. No debe aplicarse en zonas extensas ni durante largos periodos de tiempo, por riesgo de absorción. Debe usarse con precaución en extremidades de pacientes con insuficiencia de la circulación periférica y diabéticos.

EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte con su médico si se encuentra en éstos periodos. Dada la posibilidad de absorción y puesto que no se dispone de datos sobre su uso en éstos periodos, no se recomienda su empleo.

RESORCINA, SALICÍLICO, CORTICÓIDE

INFORMACIÓN AL PACIENTE

EFECTOS SECUNDARIOS: Puede producir descamación, prurito, enrojecimiento, sequedad, sensibilizaciones cutáneas; si estos efectos persisten o aparecen otros no deseados, interrumpa el tratamiento y comuníqueselo a su médico. Su empleo prolongado en zonas extensas puede producir atrofia cutánea y efectos tóxicos sistémicos. Puede ocasionar hiperpigmentación en pacientes con pieles oscuras. Si se aplica sobre el cuero cabelludo puede oscurecer el pelo rubio. Este preparado contiene bisulfito sódico como excipiente por lo que puede causar reacciones de tipo alérgico incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmos en pacientes susceptibles, especialmente en aquellos con historial asmático o alérgico.

CONSERVACIÓN:

Conservar en ambiente seco y fresco (menor a 25ºC).
Proteger del calor y luz directa.
Mantener el envase bien cerrado y lejos del alcance de los niños.

CADUCIDAD ESTIMADA: 3 meses.

SOBREDOSIS:

La intoxicación por éste medicamento, a las dosis recomendadas, es improbable.
En caso de sobredosis o ingestión accidental acudir a un centro médico, indicando el producto y la cantidad ingerida o consultar en INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 91-5620420 (24 horas).

DOPAJE: Sustancia susceptible de producir un resultado positivo en un control de dopaje.

NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA FARMACIA DISPENSADORA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

RESORCINA, SALICÍLICO, CORTICÓDE

INFORMACIÓN AL PACIENTE

ANTES DE USAR SU MEDICACIÓN, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO SI:

- Tiene dudas en cuanto a la dosis o pauta de administración.
- Está tomando otros medicamentos (también anticonceptivos orales).
- Es alérgico a algún medicamento o sustancia.
- Padece alguna enfermedad crónica: diabetes; hipertensión; úlcera gastroduodenal; glaucoma; epilepsia; insuficiencia hepática, renal, cardíaca o respiratoria; etc.
- Está embarazada o podría estarlo.
- Está en periodo de lactancia.
- Desea información sobre efectos secundarios, contraindicaciones o cualquier otra cuestión relacionada con su tratamiento.